

Fiche d'information sur le kit de secours d'urgence

Il est conseillé aux personnes qui ont déjà souffert d'une réaction allergique sévère (par ex. à cause d'une piqûre d'abeille) de porter sur elles un kit de secours d'urgence.

Ce kit de secours d'urgence contient un antihistaminique et un corticoïde à prendre suivant la posologie suivante:

Adultes et enfants à partir de 12 ans

2 comprimés d'un antihistaminique, par ex. Cetirizin Spirig HC® (comprimés de cétirizine de 10 mg)

2 comprimés d'un corticoïde, par ex. Spiricort® 50 (comprimés de prédnisolone de 50 mg)

Enfants de moins de 12 ans

1 comprimé d'un antihistaminique, par ex. Cetirizin Spirig HC® (comprimés de cétirizine de 10 mg)

1 comprimé d'un corticoïde, par ex. Spiricort® 50 (comprimés de prédnisolone de 50 mg)

Les comprimés d'antihistaminique et de corticoïde doivent être pris ensemble immédiatement après l'évènement (par ex. la piqûre d'abeille) sans attendre une réaction éventuelle. Le kit doit être complété par une seringue d'adrénaline d'urgence (Epipen® ou Epipen® Junior pour les enfants <25kg), en cas d'antécédents de réaction anaphylactique grave (gonflement du visage et sensation d'étroitesse dans la gorge, détresse respiratoire aiguë, palpitations, étourdissements ou nausées).

Après une exposition, il faut toujours consulter immédiatement le médecin le plus proche. Il est conseillé d'emporter avec soi un passeport d'allergie avec les mesures d'urgence recommandées en fonction des allergènes.

Reimers A, Müller U; Bienen- und Wespengiftallergie, Schweiz Med Forum 2004; 4:661-665

Nom	LOT	Date d'EXP	Timbre
Nom du médicament 1: _____			
Nom du médicament 2: _____			
Nom de la seringue de secours: _____			